

## Ich möchte beim Test anonym bleiben. Ist dies möglich?

Der HIV-Test ist auf Ihren Wunsch auch anonym möglich.

Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt. Auch bei uns im Institut für Medizinische Diagnostik ist die Blutentnahme nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

## Wie lange muss ich auf das Ergebnis für den HIV-Test warten?

In der Regel liegt spätestens am Folgetag nach der Blutabnahme für den Suchtest Ihr Ergebnis vor.

Befunde können persönlich (nach Ausweiskontrolle) abgeholt und/oder schriftlich versandt werden.

Überreicht durch:

Praxisstempel

### Für gesetzlich Versicherte:

Einige medizinische Leistungen können von den Krankenkassen nicht bzw. nicht in jedem Fall (z.B. auf eigenen Wunsch) übernommen werden und müssen deshalb vom Patienten selbst bezahlt werden.

Bei Überweisung durch den Arzt und medizinischer Indikation (z.B. Risikokontakt) handelt es sich um eine EBM-Leistung.

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte dem Auftragschein für individuelle Gesundheitsleistungen.

### Für privat Versicherte:

Es erfolgt eine Kostenübernahme der privaten Krankenversicherung nach gültiger GOÄ, wenn kein vorheriger Leistungsausschluss bestand. Falls Sie hierzu Fragen haben, wird Ihr Arzt Sie gerne beraten.

## HIV-Test

Wenn man sich doch einmal unsicher ist



FL\_079\_02, Fotos: © fotolia


IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR



### IMD Potsdam MVZ

Friedrich-Ebert-Str. 33  
14469 Potsdam  
Tel +49 331 28095-0  
Fax +49 331 28095-99  
Info@IMD-Potsdam.de  
IMD-Potsdam.de





## HIV

AIDS oder erworbenes Immunschwäche-Syndrom bezeichnet einen Krankheitskomplex, der aufgrund einer Infektion mit dem HI (Humanes Immundefizienz)-Virus und der damit einhergehenden Zerstörung von Immunzellen nach Jahren oder Jahrzehnten auftreten kann.

Es gibt verschiedene Therapieansätze, aber man muss feststellen, dass das HI-Virus im Körper trotz aller medizinischen Fortschritte nicht eliminiert werden kann.

Der Schutz vor Ansteckung hat deshalb nach wie vor den höchsten Stellenwert. Wirksamstes Mittel ist die Verwendung von Kondomen.

## Wie kann man sich mit HIV infizieren?

Hauptsächliche Übertragungswege sind:

- ungeschützter Geschlechtsverkehr
- Blutkontakt
- intravenöser Drogenkonsum
- Mutter-Kind-Übertragung

Wenn Sie sich doch einmal unsicher sind, kann man durch einen HIV-Test mit hoher Sicherheit eine Infektion ausschließen.

## Wann wird der HIV-Test nach einer Infektion positiv?

Eine normale Immunantwort des Körpers vorausgesetzt, sind frühestens 4 Wochen nach Infektion Antikörper gegen HIV im Blut nachweisbar.

Das HIV p24-Antigen in Blutproben kürzlich infizierter Patienten kann bereits 2 bis 3 Wochen nach der Infektion nachgewiesen werden. (Erfolgt nach der Bestimmung der AK in einem Detektionsschritt.)

Bei einem sicheren Blutkontakt mit infiziertem Blut (z.B. Nadelverletzung) oder auf Ihren Wunsch kann man mit dem Virus-Direkt-Nachweis (HIV-PCR) noch früher eine HIV-Infektion feststellen.

## Wie sicher ist der HIV-Test?

Die modernen Teste haben eine hohe Sensitivität. Das heißt bei einem negativen Testausfall und normaler Immunantwort des Körpers kann man sich sehr sicher sein, keine Infektion zu haben. Mit dem Test werden sowohl Antikörper gegen die HIV-Typen I und II als auch ein Virusprotein (Antigen) nachgewiesen.

## Was mache ich, wenn ein Test positiv ist?

Ein positives Testergebnis muss mit einer zweiten Blutprobe bestätigt werden. Darüber hinaus sollte die Viruslast im Blut bestimmt werden. Die weitere medizinische Betreuung erfolgt dann in speziell qualifizierten Arztpraxen.

Wenn Sie wissen wollen, wo sich diese befinden, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Hausarzt oder an uns.